

Hoja 4

- 1) Sean los vectores de \mathbb{R}^3

$$\vec{u}_1 = (5, -3, 8)^t, \quad \vec{u}_2 = (2, 3, 6)^t, \quad \text{y} \quad \vec{u}_3 = (3, -6, 2)^t.$$

Calcula $\|\vec{u}_i\|$ para $i = 1, 2, 3$ y $\angle(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ y $\angle(\vec{u}_2, \vec{u}_3)$ donde \angle indica el ángulo.

- 2) Si T es un triángulo determinado por dos vectores \vec{u} y \vec{v} tales que el producto de sus normas es 13 y su producto escalar es $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$, ¿cuál es el área de T ?

- 3) Explica por qué

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 (PQ + P'Q')$$

donde P' y Q' indican derivadas, define un producto escalar generalizado en $\mathbb{R}_n[x]$ (los polinomios reales de grado a lo más n). Halla a para que el producto escalar de $ax - 1$ y $2x - 8$ sea -1 .

- 4) Considera $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{C}^2$ dados por $\vec{u} = (2+3i, 8+2i)^t$ y $\vec{v} = (3+2i, 6i)^t$. Comprueba numéricamente que se cumplen para ellos las desigualdades de Cauchy-Schwarz y la triangular. Comprueba también que si cambiamos \vec{v} por $(5+i, 10-6i)^t$ la desigualdad de Cauchy-Schwarz se vuelve una igualdad.

- 5) Comprueba que la base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ de \mathbb{R}^3 con

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{u}_3 = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix},$$

es ortonormal y halla las coordenadas de $(1, 1, 0)^t$ en \mathcal{B} .

- 6) Halla una base ortogonal del subespacio V de \mathbb{R}^4 definido por

$$V = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0\}.$$

- 7) Encuentra una base ortogonal del subespacio V de \mathbb{C}^3 definido por

$$V = \{\vec{x} \in \mathbb{C}^3 : x_1 - x_2 + (i-2)x_3 = 0\}.$$

- 8) Ortogonaliza la base $\{x-1, x+1, x^2\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$ cuando se emplea el producto escalar $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$.

- 9) Escribe alguna base ortonormal de \mathbb{R}^3 que contenga al vector $(3/5, 4/5, 0)^t$.

- 10) Halla las ecuaciones que definen V^\perp donde $V \subset \mathbb{R}^5$ viene dado por

$$V = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^5 : x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = x_2 + x_4 + x_5 = 2x_2 + x_3 + 4x_5 = 0\}.$$

11) Halla la proyección ortogonal del vector $\vec{v} = (-3, 11, 1)^t \in \mathbb{R}^3$ en el subespacio que determina el plano $2x_1 - 5x_2 + x_3 = 0$ de \mathbb{R}^3 . ¿Cuál es la distancia del punto $(-3, 11, 1)$ al plano?

12) Halla la proyección ortogonal del vector $\vec{v} = (8, 3, 2, 0)^t \in \mathbb{R}^4$ al subespacio de \mathbb{R}^4 definido por

$$V = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : 3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = x_1 + 6x_2 - 2x_3 - x_4 = 0\}$$

y utilízala para hallar la distancia del punto $(8, 3, 2, 0)$ a V .

13) Considera la función $f(x) = 1/(x+1)$ la cual es un vector del espacio vectorial de las funciones continuas en $[0, 1]$ con el producto escalar $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ y calcula su proyección ortogonal sobre $\mathbb{R}_2[x]$. Si tienes ocasión dibuja la función y su proyección y verás que se parecen. Para las integrales puedes usar un integrador *online* o paquetes de *software* matemático.

14) Considera el siguiente subespacio de \mathbb{C}^3 de un ejercicio anterior:

$$V = \{\vec{x} \in \mathbb{C}^3 : x_1 - x_2 + (i - 2)x_3 = 0\}.$$

Halla la proyección ortogonal del vector $\vec{v} = (2 - i, 2i, 2i)^t$. Nota que en el producto escalar de \mathbb{C}^n el orden es importante.

15) Indica si las siguientes matrices son unitarias:

$$\frac{\sqrt{2}}{10} \begin{pmatrix} 5 - 3i & 4i \\ 4i & 5 + 3i \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 + i & 2 + 2i \\ -2 + 2i & 4 - i \end{pmatrix}.$$

16) Si la primera y la segunda columna de una matriz ortogonal de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ son respectivamente $c_1 = (2/3, -2/3, -1/3)^t$ y $c_2 = (-1/3, -2/3, 2/3)^t$ halla todas las posibilidades para la tercera columna.

17) ¿Cuántas matrices hay en $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ que sean a la vez ortogonales y diagonales? Aparte de ellas, ¿existen matrices en $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ortogonales y triangulares superiores? Recuerda o aprende que las matrices triangulares superiores son las que tienen $a_{ij} = 0$ para $i > j$.