

Hoja 1

1) Resuelve los siguientes sistemas con matriz escalonada:

$$\begin{array}{rclcl} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 & = & -5, & & \\ 3x_2 + x_3 + 3x_4 & = & 10, & & \\ 2x_3 + 2x_4 & = & -2, & & \\ x_4 & = & 1 & & \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{rcl} (1 + 2i)x_1 + (2 + 3i)x_2 & = & -6 + 5i, \\ (3 + 4i)x_2 & = & -11 + 2i. \end{array}$$

2) Resuelve el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 7 & 11 & 5 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3) Resuelve el sistema con números complejos

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +ix_3 & = 0, \\ ix_1 & + (1+i)x_3 & = -2-i, \\ x_2 & + (2+i)x_3 & = -1-i. \end{array}$$

4) Expresa todas las soluciones del siguiente sistema como $\vec{x} = \lambda\vec{v}_1 + \mu\vec{v}_2$ donde todas las coordenadas de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son enteras.

$$\begin{array}{rclcl} 2x_1 & +2x_2 & +7x_3 & +3x_4 & = 0, \\ x_1 & +x_2 & +2x_3 & +x_4 & = 0, \\ -x_1 & -x_2 & +x_3 & & = 0. \end{array}$$

5) Halla todas las soluciones del sistema

$$\begin{array}{rclcl} 3x_1 & -8x_2 & +11x_3 & +x_4 & = 0, \\ 2x_1 & -5x_2 & +7x_3 & +x_4 & = 0, \\ 5x_1 & -13x_2 & +18x_3 & +2x_4 & = 0. \end{array}$$

6) En un examen pasado de acceso a la universidad se pedía discutir el sistema

$$\begin{array}{rclcl} 2x & +\lambda y & +\lambda z & = & 1-\lambda, \\ x & +y & +(\lambda-1)z & = & -2\lambda, \\ (\lambda-1)x & +y & +z & = & \lambda-1 \end{array}$$

en términos del parámetro real λ . Hazlo con lo aprendido en este curso.

7) Calcula la última fila no nula de la forma escalonada reducida de la matriz ampliada del sistema del problema anterior para $\lambda = -1$ y para $\lambda = 1 + i$.

8) Halla las inversas de las siguientes matrices compuestas por ceros y unos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9) Sea a un parámetro real no nulo. Comprueba que la matriz

$$\begin{pmatrix} \alpha + 3\beta & -\beta & -2\beta \\ 2\beta & \alpha & 2\alpha - 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad \alpha = 2a - a^{-1}, \quad \beta = -a + a^{-1}$$

tiene la propiedad de que al cambiar a por a^{-1} se obtiene su inversa. *Indicación:* Comprueba que tras el cambio α y β se transforman en $\alpha + 3\beta$ y $-\beta$.

10) Halla todas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \quad \text{con} \quad ad - bc = -1$$

tales que coinciden con su inversa. Escribe dos ejemplos, uno con $a, b, c, d \in \mathbb{R} - \{0\}$ y otro con $a, b, c, d \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$.

11) Considera

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 6 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcula las inversas de A , B y de AB^{-1} . *Indicación:* Para la última puedes aprovechar cálculos ya hechos.

12) Si A es una matriz que cumple $A^3 = O$ se sabe que $I + 2A$ es siempre invertible y su inversa es de la forma $I + xA + yA^2$. Halla x e y . Si quieres comprobar tu resultado con un ejemplo puedes tomar $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ con todos sus elementos nulos excepto $a_{12} = a_{23} = 1$.

13) Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas dando una pequeña explicación en el primer caso o un contraejemplo en el segundo.

a) Si la matriz de coeficientes de un sistema es cuadrada no puede tener infinitas soluciones.

b) Si $A\vec{x} = \vec{b}$ es compatible determinado y A tiene las dos primeras columnas iguales entonces la solución cumple $x_1 = x_2$.

c) Si A es invertible entonces la inversa de AA^t siempre coincide con $A^{-1}(A^{-1})^t$.

d) Si A es invertible entonces $A^2 + 4I$ también lo es.