

ÁLGEBRA II

Hoja 5. Diagonalización de endomorfismos

1. Determina en cada caso una base de \mathbb{R}^n (o de \mathbb{C}^n) en la que las matrices dadas a continuación diagonalicen:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, C_4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -15 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Para cada uno de ellos encuentra matrices de cambio de base P_i y matrices diagonales D_i de modo que $C_i = P_i D_i P_i^{-1}$.

2. Decide de manera razonada para qué valores de los parámetros son diagonalizables los endomorfismos de \mathbb{R}^3 que en la base estándar tienen como matriz:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ 3 & 5 & 3 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

3. Diagonaliza en una base ortonormal el endomorfismo dado en la base canónica:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

4. Comprueba que la siguiente matriz es diagonalizable

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$$

y da la matriz diagonalizada y la matriz de cambio de base. ¿Es la matriz invertible? Si así fuera, calcula su inversa usando la matriz diagonalizada.

5. Dadas las matrices

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5/2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

calcula:

a) A_k^{10} para $k = 1, 2$.

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_k^n$ para $k = 1, 2$.

6. Sea $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de \mathbb{C}^3 y sean $f, g : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ los endomorfismos con matrices:

$$M_B(f) = [f]_{BB} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad M_B(g) = [g]_{BB} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Decide de manera razonada por qué ninguno de los dos endomorfismos es diagonalizable.

7. Sea V un espacio vectorial de dimensión n , sea $W \subset V$ un subespacio vectorial de V y sea $Z \subset V$ un complementario de W (i.e., $W \oplus Z = V$). De este modo, cada $u \in V$ se escribe de manera única como la suma de un vector en W y otro en Z , i.e., $u = w + z$ con $w \in W$ y $z \in Z$. Decimos que $f : V \rightarrow V$ es la *simetría respecto a W con dirección Z* si para cada vector $u \in V$ con $u = w + z$ como antes, $f(u) = w - z$. Observa que una simetría es, en particular, una aplicación lineal.

a) Demuestra que una simetría siempre es diagonalizable.

b) Si V es un espacio vectorial euclídeo (o unitario) demuestra que f es una aplicación ortogonal si y sólo si $Z = W^\perp$.

8. Sea V un espacio vectorial de dimensión n , sea $W \subset V$ un subespacio vectorial de V y sea $Z \subset V$ un complementario de W (i.e., $W \oplus Z = V$). Decimos que $g : V \rightarrow V$ es la *proyección sobre W con dirección Z* si para cada vector $u \in V$ con $u = w + z$ como antes, $g(u) = w$. Observa que una proyección es, en particular, una aplicación lineal.

a) Demuestra que una proyección siempre es diagonalizable.

b) Supongamos que V es un espacio vectorial euclídeo (o unitario). Entonces $V = W \oplus W^\perp = W \oplus Z$ donde Z un complementario cualquiera de W . Para cada $u \in V$ tenemos dos representaciones: $u = w + z$ con $w \in W$ y $z \in Z$, y $u = w_1 + w_2$ con $w_1 \in W$ y $w_2 \in W^\perp$. Demuestra que $\|w_2\| \leq \|z\|$. Es decir, de entre todas las proyecciones sobre W , la ortogonal es la que minimiza la distancia de un vector a W .


9. Decide de manera razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Si f es diagonalizable y biyectiva, entonces f^{-1} es diagonalizable.

b) Si f es diagonalizable entonces $\tilde{f} = f^*$ es diagonalizable.

10. En un bosque maderero, los árboles están clasificados en dos tamaños. Un censo que se hace cada 5 años reclasifica un 30% de los árboles de tamaño menor, que pasan a ser de tamaño grande. Entre cada dos censos se corta un 10% de los árboles de tamaño grande y se repuebla con el mismo número de árboles de tamaño pequeño. ¿Aumenta el número de árboles con el tiempo? Si inicialmente había 1000 árboles de tamaño pequeño y ninguno grande, ¿cuántos árboles de tamaño grande hay a los 20 años? (**Sugerencia:** si x_n (resp. y_n) representa el número de árboles pequeños (resp. grandes) después de n períodos de 5 años, se tiene $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix}$ para una cierta matriz A que convendrá diagonalizar).

11. Supongamos que tenemos dos depósitos de igual volumen con agua comunicados por un doble conducto por el que circula el agua como sigue:



Inicialmente, en el primer depósito hay NaCl disuelto al 1 %, y en el segundo hay NaCl disuelto al 2%. Cada minuto pasa un 5% del volumen del primer depósito al segundo y viceversa. Decide de manera razonada la concentración de NaCl que habrá en cada uno de los depósitos después de 120 minutos. ¿Qué prevés que suceda a largo plazo?

12. Los *dusky-footed wood rats* son un tipo de roedor común en los bosques de California, cuyo depredador natural es el búho moteado. Denotamos por O_k la población de búhos después de k meses y por R_k la población de roedores después de k -meses. Supongamos que

$$\begin{aligned} O_{k+1} &= 0.5O_k + 0.4R_k \\ R_{k+1} &= -pO_k + 1.1R_k \end{aligned}$$

donde p es una constante positiva. El sumando $0.5O_k$ indica que si no hay roedores, la tasa de supervivencia de los búhos es del 50% al mes, mientras que el sumando $1.1R_k$ nos dice que en ausencia de búhos, los

roedores crecerían a un ritmo del 10% al mes. El término $0.4R_k$ indica el crecimiento de los búhos en presencia de los roedores, y el término $-pO_k$ mide la desaparición de roedores debido a la caza por parte de los búhos.

a) Determina la evolución de las dos poblaciones a largo plazo si $p = 0.104$.

b) Determina la evolución de las dos poblaciones a largo plazo si $p = 0.2$. ¿Crece la población de búhos? ¿Y la de roedores?

c) Determina un valor de p para el que el número de individuos de ambas poblaciones se estabilice a largo plazo. ¿Cuál será entonces la proporción entre ambas poblaciones? Se puede probar que este *equilibrio* entre ambas poblaciones es inestable (cualquier cambio menor en alguno de los datos provoca decrecimiento o crecimiento de ambas poblaciones a largo plazo).